



12-5-2022

OXFORD
ACADEMIC

RHEUMATOLOGY

ACCEPTED MANUSCRIPT

Clinical characteristics and risk factors associated with lymphoma in patients with systemic lupus erythematosus: a nationwide cohort study

Get access >

María Martín-López ✉, Maria Galindo, José María Pego-Reigosa, Norman Jiménez, Alejandro Olivé Marqués, Eva Tomero, Mercedes Freire, Julia Martínez-Barrio, Alina Boteanu, Eva Salgado-Perez ... Show more

Υπόβαθρο – Σκοπός

- Μελέτη αξιολόγησης των χαρακτηριστικών και του κίνδυνου λεμφώματος σε μια μεγάλη ομάδα ασθενών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ).

Μέθοδοι

- Ομάδα ασθενών με ΣΕΛ από την Ισπανική Εταιρεία Ρευματολογίας-Μητρώου ΣΕΛ (RELESSER). Τα κλινικά και αναλυτικά χαρακτηριστικά συγκρίθηκαν μεταξύ της ομάδας ΣΕΛ- λεμφώματος και της ομάδας ελέγχου με ΣΕΛ

Αποτελέσματα

- Αναγνωρίστηκαν 21 ασθενείς με ΣΕΛ και λέμφωμα και 3.965 μάρτυρες με ΣΕΛ χωρίς λέμφωμα.
- Τα περισσότερα λεμφώματα ήταν Β προέλευσης (n=15/21), με το διάχυτο λέμφωμα να είναι ο πιο συχνός ιστολογικός τύπος (8/21, 38,1%).
- Όπως και στον γενικό πληθυσμό, ο κίνδυνος λεμφώματος στον ΣΕΛ ήταν υψηλότερος στους άνδρες παρά στις γυναίκες και αυξανόταν με την ηλικία.
- Στην ομάδα του λεμφώματος-ΣΕΛ, διαπιστώθηκε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό περικαρδίτιδας, οργανικού συνδρόμου, επιληπτικών κρίσεων, αγγειίτιδας, αιμολυτικής αναιμίας, σπληνομεγαλίας, φλεβικής θρόμβωσης και μέσου τροποποιημένου (εξαιρουμένου του λεμφώματος) δείκτη βλάβης SLICC/ACR.
- Αντίθετα, η νεφρική συμμετοχή, τα θετικά anti-dsDNA και η λήψη ανθελανοσοιακών ήταν λιγότερο συχνά.

Συμπεράσματα

- Σε αυτή τη μεγάλη πολυκεντρική κοόρτη, εντοπίστηκαν χαρακτηριστικά του ΣΕΛ που σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο λεμφώματος.
- Τα ανθελανοσοιακά φάνηκε να συσχετίζονται αρνητικά με τον κίνδυνο λεμφώματος σε ασθενείς με ΣΕΛ.

Rheumatology, 2022;;
keac258, <https://doi.org/10.1093/rheumatology/keac258>