




PSORIATIC ARTHRITIS · Articles in Press, September 25, 2025

Download Full Issue

The likelihood of joint inflammation recurrence in previously affected joints during psoriatic arthritis disease course

Mark Berman · Ori Elkayam · Dafne Capelusnik

Υπόβαθρο – Μέθοδοι

- Να αξιολογηθεί η πιθανότητα επανεμφάνισης φλεγμονής στις αρθρώσεις που είχαν προηγουμένως προσβληθεί κατά τη διάρκεια της πορείας της ψωριασικής αρθρίτιδας, και να εντοπιστούν ειδικοί για κάθε άρθρωση παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο υποτροπής, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την καθημερινή πρακτική.
- Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με ΨΑ (ψωριασική αρθρίτιδα) που παρακολουθούνταν στο Ρευματολογικό Ινστιτούτο του Ιατρικού Κέντρου του Τελ Αβίβ. Σε κάθε επίσκεψη αξιολογούνταν ο αριθμός των διογκωμένων αρθρώσεων (SJC68). Η συσχέτιση μεταξύ αρχικής διόγκωσης της άρθρωσης και υποτροπής αναλύθηκε με χρήση λογιστικής παλινδρόμησης μικτών επιδράσεων, προσαρμοσμένης ως προς τη θέση της άρθρωσης και την επίσκεψη παρακολούθησης. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση αλληλεπίδρασης για να προσδιοριστεί η συσχέτιση ανά θέση άρθρωσης.

Αποτελέσματα

- Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 492 ασθενείς, με διάμεσο αριθμό 6 (IQR 4–9) επισκέψεων παρακολούθησης. Από αυτούς, το 44% ήταν άνδρες, με μέση ηλικία κατά την έναρξη τα 48 έτη (SD 15) και μέση διάρκεια νόσου 1 έτος (1,9).
- Στην αρχική αξιολόγηση, 420 (85%) ασθενείς είχαν τουλάχιστον μία διογκωμένη άρθρωση, με διάμεσο SJC68 ίσο με 2 (1–5). Από τις 33.456 αρθρώσεις που αξιολογήθηκαν, οι 1.402 ήταν διογκωμένες στην αρχή (4,2%), και οι 514 (36,7%) από αυτές παρουσίασαν υποτροπή κατά την παρακολούθηση. Η λογιστική παλινδρόμηση μικτών επιδράσεων έδειξε ότι η αρχική διόγκωση προέβλεπε μελλοντική διόγκωση (λόγος πιθανοτήτων 2,88, 95% ΔΕ 2,61–3,18), με διακυμάνσεις ανάλογα με τη θέση της άρθρωσης. Η συσχέτιση αυτή δεν επηρεάστηκε από το φύλο, την ηλικία ή τη διάρκεια της νόσου.

Συμπεράσματα

- Η μελέτη ανέδειξε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της αρχικής διόγκωσης των αρθρώσεων και των επακόλουθων επεισοδίων διόγκωσης σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα.
- Η συσχέτιση αυτή διαφοροποιήθηκε ανά άρθρωση και παρέμεινε στατιστικά σημαντική ακόμη και όταν η ανάλυση περιορίστηκε στις πιο συχνά διογκωμένες αρθρώσεις.

<https://doi.org/10.1016/j.ard.2025.08.020>