



Υποδόρια χορηγούμενο Belimumab



Σε ασθενείς με μέτριας - σοβαρής μορφής ΣΕΛ, η **εβδομαδιαία υποδόρια χορήγηση belimumab** (200 mg SC) σε συνδυασμό με την «κλασσική» θεραπεία βελτιώνει σημαντικά την ενεργότητα της νόσου και μειώνει τις σοβαρές εξάρσεις, με προφίλ

ασφάλειας παρόμοιο αυτού του εικονικού φαρμάκου σε

συνδυασμό με την «κλασσική» αγωγή.

Τα ευρήματα βασίζονται σε μια RCT μελέτη 52 εβδομάδων με 839 ασθενείς με αρχικό SELENA-SLEDAI score 10.5

- απόκριση στο [SR14](#) πέτυχαν περισσότεροι ασθενείς υπό Belimumab παρά υπό placebo (61.4% vs 48.4%; odds ratio [OR] [95% CI]: 1.68 [1.25, 2.25]; $p=0.0006$)
- βελτίωση φάνηκε επίσης στο χρονικό διάστημα μέχρι την έξαρση ή τον κίνδυνο ανάπτυξης αυτής (171.0 versus 118.0 ημ - HR [95% CI]: 0.51 [0.35, 0.74], $p=0.0004$), καθώς και στην μείωση της δόσης των κορτικοστεροειδών
- η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια μεταξύ των 2 ομάδων, ενώ σοβαρές ΑΕ αναφέρθηκαν αντίστοιχα στο 10.8% (belimumab) και 15.7% (placebo)



Efficacy and safety of subcutaneous belimumab in systemic lupus erythematosus: A randomized, double-blind, placebo-controlled, 52-week study . William Stohl MD, PhD, Andreas Swarting MD, Masato Okada MD, Morton Scheinberg MD, et al. Arthritis & Rheumatology. Accepted manuscript online: 24 January 2017. DOI: 10.1002/art.40049

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη.