




## IgA αγγειίτιδα ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Γαλλικό αρχείο)



Πρόκειται για τη  
**μεγαλύτερη κούρτη**  
**ενηλίκων ασθενών με**  
 IgA αγγειίτιδα (Henoch-  
 Schönlein purpura)  
 (French Vasculitis

Study Group, με 260

ασθενείς), σύμφωνα με την οποία :

- με μέση ηλικία διάγνωσης 50.1±18 έτη, το 63% ήταν άνδρες, με αρχική εκδήλωση :
  - πορφύρα (100%)
  - σπειραματονεφρίτιδα (70%) – 30% νεφρική ανεπάρκεια (από την αρχή)
  - αρθραλγίες (62%)
  - προσβολή γαστρεντερικού (53%)
- Από τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία μόνο με κορτικοστεροειδή, το 80% (64/80) απάντησε στη θεραπεία, σε αντίθεση με το 77% (23/30) που αποκρίθηκε στην κυκλοφωσφαμίδη και το 59% (10/17) στην κολχικίνη
  - Από τις υπο-αναλύσεις που έγιναν, φάνηκε ότι η χορήγηση μόνο κορτικοστεροειδών αποτελεί μια λογική αγωγή πρώτης γραμμής, ενώ η προσθήκη κυκλοφωσφαμίδης επιλογή αβέβαιης ωφέλειας

*Characteristics and management of IgA vasculitis (Henoch-Schönlein purpura) in adults: Data from the 260 patients included in the IGAVAS survey. Audemard-Verger A1, Terrier B1, Dechartres A2, et al; French Vasculitis Study Group (FVSG). Arthritis Rheumatol. 2017 Jun 12. doi: 10.1002/art.40178. [Epub ahead of print]*

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη  
 Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
 Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο