



MTX στην PA & ΣΔ



Οι ασθενείς με PA υπό μεθοτρεξάτη (MTX) έχουν μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν ΣΔ II σε σχέση με ασθενείς χωρίς έκθεση σε MTX, σύμφωνα με

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (*MEDLINE, Cochrane, Scopus*) και μετανάλυση (16 μελέτες), όπου φάνηκε ότι, η χορήγηση MTX σχετίστηκε με μικρότερο κίνδυνο για ανάπτυξη ΣΔ II (*Relative risk 0.48, 95% CI 0.16, 1.43*)

Baghdadi LR. Effect of methotrexate use on the development of type 2 diabetes in rheumatoid arthritis patients: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2020;15(7):e0235637. Published 2020 Jul 6. doi:10.1371/journal.pone.0235637

[ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ](#)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.