

Μονοθεραπεία με βιολογικό στην ΡΑ

RHEUMATOLOGY

Δεδομένα από το Δανέζικο αρχείο δεδομένων με **775** ασθενείς με ΡΑ σε μονοθεραπεία με βιολογικό παράγοντα (19% των ασθενών του αρχείου ήταν σε μονοθεραπεία)

- Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι βιολογικοί ήταν etanercept (36.6%), adalimumab (21.3%) και tocilizumab (15.3%)
- Στους 6 μήνες, ύφεση σύμφωνα με το CDAI (*clinical disease activity index*) ήταν 22%, σύμφωνα με το **28-joint DAS 41%, ενώ η απόκριση ACR50 ήταν 28%**
- Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η παραμονή στην θεραπεία ήταν αποδεκτή και παρόμοια μεταξύ των βιολογικών, με εξαίρεση το infliximab, για το οποίο φάνηκε σημαντικά μικρότερη παραμονή ($P < 0.001$). Η συνολική παραμονή στα 2 χρόνια, εκτός του infliximab, ήταν περίπου 70%. Διαφορές μεταξύ βιολογικών διαφορετικού τρόπου δράσης, δεν φάνηκαν



Effectiveness and drug adherence of biologic monotherapy in routine care of patients with rheumatoid arthritis: a cohort study of patients registered in the Danish biologics registry. Jørgensen TS1, Kristensen LE2, Christensen R3, Bliddal H1, Lorenzen T4, Hansen MS5, Østergaard M6, Jensen J7, Zanjani L6, Laursen T8, Butt S9, Dam MY10, Lindegaard HM11, Espesen J12, Hendricks O13, Kumar P14, Kincses A15, Larsen LH16, Andersen M17, Næser EK4, Jensen DV18, Grydehøj J19, Unger B20, Dufour N21, Sørensen V22, Vildhøj S23, Jensen Hansen IM24, Raun J25, Krogh NS26, Lund Hetland M27. Rheumatology (Oxford). 2015 Dec;54(12):2156-65. doi: 10.1093/rheumatology/kev216.

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη