



## Ανθεκτική σε βιολογικούς ΡΑ



Σύμφωνα με δεδομένα από το Βρετανικό αρχείο (*British Society for Rheumatology Biologics Register for RA*)

**ανθεκτική σε βιολογικούς ΡΑ (έναρξη τρίτης κατηγορίας βιολογικού)** διαπιστώνεται στο 6% των ασθενών με ΡΑ που έλαβαν βιολογικό (867 από τους 13.502). Ο μέσος χρόνος μέχρι την έναρξη της 3<sup>η</sup> κατηγορίας βιολογικού είναι περίπου 8 χρόνια

*Kearsley-Fleet L, Davies R, De Cock D the BSRBR-RA Contributors Group, et al Biologic refractory disease in rheumatoid arthritis: results from the British Society for Rheumatology Biologics Register for Rheumatoid Arthritis Annals of the Rheumatic Diseases 2018;77:1405-1412. First published July 6, 2018.*

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ [ΕΛΕΥΘΕΡΑ](#)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.