



Νόσος Parkinson & TNFi σε ΦΝΕ

April 23, 2018
More ▾

Anti-Tumor Necrosis Factor Therapy and Incidence of Parkinson Disease Among Patients With Inflammatory Bowel Disease

Inga Peter, PhD¹; Marla Dubinsky, MD²; Susan Bressman, MD³; et al

> Author Affiliations

JAMA Neurol. Published online April 23, 2018. doi:10.1001/jamaneurol.2018.0605

Δεδομένου ότι υπάρχουν κοινοί γενετικοί και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί μεταξύ Νόσου Parkinson (NP) και ΦΝΕ, εκτιμήθηκε η επίπτωση της NP σε ασθενείς με ΦΝΕ, με ή χωρίς έκθεση

σε TNFi, σε μια αναδρομική εκτίμηση δεδομένων από βάσεις όπως Truven Health MarketScan database και Medicare Supplemental Database.

Φάνηκε **μεγαλύτερη επίπτωση NP σε ασθενείς με ΦΝΕ (28%)** σε σχέση με άτομα χωρίς ΦΝΕ. Η **έκθεση σε TNFi σχετίστηκε με ουσιαστική μείωση (78%) της επίπτωσης NP**, σε σχέση με ασθενείς με ΦΝΕ χωρίς έκθεση TNFi.

Anti-Tumor Necrosis Factor Therapy and Incidence of Parkinson Disease Among Patients With Inflammatory Bowel Disease. Inga Peter, PhD¹; Marla Dubinsky, MD²; Susan Bressman, MD³; et al Andrew Park, PhD, MPH⁴; Changyue Lu, MS⁴; Naijun Chen, MS⁴; Anthony Wang, PhD, MP. JAMA Neurol. Published online April 23, 2018. doi:10.1001/jamaneurol.2018.0605

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.