



Best of ACR 2016



Η συνέχιση
 μονοθεραπείας με
 DMARDs (όπως MTX,
 HCQ, LEF) ή
 συνδυασμού MTX &
 TNFi σε ασθενείς με
 RA κατά την περι-
 εγχειρητική περίοδο **ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ** με

αυξημένη συχνότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών λοιμώδους φύσεως
 ή λοιμώξεις χειρουργικών τομών. Τα δεδομένα έρχονται από μια αναδρομική μελέτη, στην
 οποία περιελήφθησαν κάθε είδους χειρουργική επέμβαση (σύνολο 9.362 ασθενείς)

Perioperative Use of Synthetic Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs or Tumor Necrosis Factor α Inhibitors Does Not Associate with Increased Rates of Post-Operative Infections. Hsin-Hsuan Juo^{1,2}, Anders Peck .ABSTRACT NUMBER: 2001

Η μελέτη NOR-SWITCH είναι μια μελέτη φάσης IV, 52 εβδομάδων, με σκοπό να εκτιμήσει
 ευρήματα από την **αλλαγή από το πρωτότυπο infliximab στο biosimilar (CTP-13)** σε 481
 ασθενείς με όλες τις ενδείξεις (241 παρέμειναν στο προτότυπο και 240 “πέρασαν” στο CTP-
 13) και έδειξε ότι μια τέτοια **αλλαγή δεν είναι κατώτερη από την περίπτωση διατήρησης**
 αγωγής στο πρωτότυπο φάρμακο

Biosimilar Infliximab (CT-P13) Is Not Inferior to Originator Infliximab: Results from a 52-Week Randomized Switch Trial in Norway . Guro Løvik Goll^{1,2}, Inge C Olsen, et al, ABSTRACT NUMBER: 19L

Το **abatacept φαίνεται να βελτιώνει την ΨΑ** και να είναι καλά ανεκτό, ανεξάρτητα από
 προηγηθείσα έκθεση σε TNF αναστολέα, σύμφωνα με τη μελέτη φάσης III ASTRAEA, με 423
 ασθενείς με ενεργό νόσο (ACR20 24w: 39,4%)

P Mease¹, AB Gottlieb et al. Abatacept in the Treatment of Active Psoriatic Arthritis: 24-Week Results from a Phase III Study . ABSTRACT NUMBER: 1041

Η **ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του certolizumab pegol είναι παρόμοια με αυτή**
του adalimumab, μετά από 2 χρόνια αγωγής, σε ασθενείς με (μέτριας-σοβαρής μορφής)

PA, χωρίς διαφορές ακόμη και στις 12 εβδομάδες (ACR20 69.2% vs 71,4%), σύμφωνα με την προοπτική head-head μελέτη EXXELERATE με 915 ασθενείς

Fleischmann R, et al "Comparison of certolizumab pegol versus adalimumab: 2 year efficacy and safety results from a superiority, investigator-blind, head-to-head study" ACR 2016; Abstract 2987.

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση των περιλήψεων των μελετών

Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη