



## Και μετά την αποτυχία RTX ...τι ?

### RHEUMATOLOGY

Δεδομένα 6 μηνών από **265** ασθενείς με PA (*Collaborative Registries for the Evaluation of Rituximab in RA Collaborative*) μετά από αποτυχία σε rituximab

- Ασθενείς υπό **tocilizumab (n = 86)** παρουσίασαν **μεγαλύτερη μείωση στο DAS28-ESR και στην ενεργότητα νόσου (clinical disease activity index)** σε σχέση με ασθενείς υπό TNFi αναστολή (n = 89) ή abatacept (n = 90)
- Το μέσο DAS28-ESR score σε ασθενείς υπό TCZ ήταν 1.0 (95% CI: 0.2, 1.7) και 1.8 (95% CI: 1.0, 2.5) βαθμούς χαμηλότερο σε σχέση με αυτούς υπό TNFi ή ABA
- Η κλινική επίσης ενεργότητα (clinical disease activity index) ήταν 9.4 (95% CI: 1.7, 16.1) και 8.1 (95% CI: 0.9, 15.3) βαθμούς χαμηλότερα με TOC σε σχέση με TNFi ή ABA
- Παρόμοια ήταν τα ευρήματα για απόκριση κατά EULAR (66 vs 31 vs 14%,  $P < 0.001$ ) ενώ για το HAQ δεν διαπιστώθηκαν διαφορές
- Τα ευρήματα ήταν ανεξάρτητα από την αρχική δόση στεροειδών, τον αριθμό προηγηθέντων βιολογικών παραγόντων ή τον λόγο διακοπής του RTX

*Rituximab done: what's next in rheumatoid arthritis? A European observational longitudinal study assessing the effectiveness of biologics after rituximab treatment in rheumatoid arthritis. Walker UA1, Jaeger VK2, Chatzidionysiou K3, Hetland ML4, Hauge EM5, Pavelka K6, Nordström DC7, Canhão H8, Tomšič M9, van Vollenhoven R3, Gabay C. Rheumatology (2016) 55 (2): 230-236. doi: 10.1093/rheumatology/kev297*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης

και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη