



## Anti-CRP αντισώματα & νεφρίτιδα λύκου



Την μακροχρόνια προγνωστική αξία των αντισωμάτων έναντι monomeric C-reactive protein (anti-CRP-Ab), αντισωμάτων που έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με ΣΕΛ και νεφρίτιδα λύκου και τα οποία έχουν συσχετισθεί με ενεργό νόσο και φτωχή θεραπευτική απόκριση, παρουσιάζει η συγκεκριμένη μελέτη σε 57 ασθενείς με ΣΕΛ και (με βιοψία επιβεβαίωση) νεφρίτιδα λύκου και σύγκριση με υγιή πληθυσμό.

- Anti-CRP-Ab ανιχνεύθηκαν ΜΟΝΟ σε ασθενείς με ΕΝΕΡΓΟ νεφρική νόσο, τα δε επίπεδα σχετίστηκαν με το SLEDAI ( $rs = 0.165$ ,  $p = 0.002$ )
- Το χρονικό διάστημα μέχρι την θεραπευτική απόκριση ήταν μικρότερο σε ασθενείς χωρίς αυτά τα αντισώματα
- Στον 2<sup>ο</sup> χρόνο θεραπείας, η παρουσία anti-CRP-Ab σχετίστηκε με «δυσμενή» θεραπευτική έκβαση ενώ η προγνωστική τους αξία ενισχύθηκε κατά την εκτίμηση «δυσμενής έκβαση» και στον 1<sup>ο</sup> χρόνο θεραπείας
- Η παρουσία τους πάντως δεν φάνηκε να επηρεάζει την έκβαση στο τέλος της παρακολούθησης



*Prognostic value of anti-CRP antibodies in lupus nephritis in long-term follow-up. Pesickova SS1,2, Rysava R3, Lenicek M4, Vitek L5,6, Potlukova E7,8, Hruskova Z9, Jancova E10, Honsova E11, Zavada J12, Trendelenburg M13,14, Tesar V15. Arthritis Res Ther. 2015 Dec 24;17(1):371. doi: 10.1186/s13075-015-0879-8.*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη