



ΜΣΑΦ στον πόνο της σπονδυλικής στήλης

Και ενώ είναι πλέον πλήρως κατανοητό ότι η παρακεταμόλη δεν είναι αποτελεσματική στον πόνο της σπονδυλικής στήλης, τα ΜΣΑΦ, σύμφωνα με την τελευταία **συστηματική ανασκόπηση** της βιβλιογραφίας, φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στην κατάσταση αυτή, το μέγεθος όμως της διαφοράς με το εικονικό φάρμακο στις διάφορες εκβάσεις, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.

Απλά αναλγητικά λοιπόν, με κλινικά σημαντικό όφελος στον σπονδυλικό πόνο έναντι του εικονικού φαρμάκουαπλά δεν υπάρχουν

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται από μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μετανάλυση 35 RCTs μελετών, όπου φάνηκε ότι, τα ΜΣΑΦ μειώνουν τον πόνο και την ανικανότητα, η δράση όμως αυτή ΔΕΝ ήταν κλινικά σημαντική έναντι του placebo.

Τα ΜΣΑΦ σχετίστηκαν όμως και με 2,5 φορές αύξηση του κινδύνου για γαστρεντερικές αντιδράσεις, έστω και αν η μέση διάρκεια των μελετών ήταν7 ημέρες



Non-steroidal anti-inflammatory drugs for spinal pain: a systematic review and meta-analysis

Gustavo C Machado¹, Chris G Maher¹, Paulo H Ferreira², Richard O Day³, Marina B Pinheiro², Manuela L

Ferreira^{1,4}. Ann Rheum Dis doi:10.1136/annrheumdis-2016-210597 Published Online First 2 February 2017

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

[ΜΣΑΦ & CVD \(FDA ανακοίνωση 9/15\)](#)

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη.