



Whipple's arthritis



Η νόσος του Whipple (Whipple's disease) είναι μια χρόνια συστηματική λοίμωξη (*Tropheryma whipplei*) η οποία μπορεί

να θεραπευθεί με την κατάλληλη αντιβίωση.

- Ο τυπικός ασθενής είναι ένας μεσήλικας άνδρας όπου, στις περισσότερες περιπτώσεις, **διάρροια και απώλεια βάρους προηγούνται μιας χαρακτηριστικής αρθρικής** προσβολής με διαλείπον χαρακτήρα, τουλάχιστον στην αρχή.
- Το σύνηθες χρονικό διάστημα από την έναρξη των αρθρικών συμπτωμάτων, με εικόνα **ολιγοαρθρίτιδας ή πολυαρθρίτιδας** και απουσία RF, μέχρι τη διάγνωση, είναι 6 χρόνια. Σε απουσία διάγνωσης, συχνά η κατάσταση οδηγείται σε χρόνια σηπτική καταστροφική αρθρίτιδα
- Πιο σπάνια έχουν αναφερθεί περιστατικά σπονδυλοαρθρίτιδας, δισκίτιδας ή υπερτροφικής OA
- Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρώση PAS (*periodic acid-Schiff*) σε βιοψίες πεπτικού παρουσιάζουν έγκλειστα μακροφάγων που περιέχουν βακτήρια
- Υπάρχουν πάντως περιπτώσεις «σιωπηλής» προσβολής εντέρου (κλινικά ή ιστολογικά) ή άλλες, ακόμη και με αρνητική PCR βιοψιών εντέρου. Στις περιπτώσεις αυτές, υποψία λοίμωξης με *T. whipplei* πρέπει να τίθεται σε κάθε μεσήλικα άνδρα με ανεξήγητη διαλείπουσα ολιγοαρθρίτιδα.

Whipple's arthritis. Xavier Puéchal. Joint Bone Spine Volume 83, Issue 6, December 2016, Pages 631–635

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη