

## Η αντιμετώπιση της ΡΑ τελευταία στις ΗΠΑ

Δεδομένα από μια σειρά παρακολούθησης ασθενών με ΡΑ από τη Northern California , με σκοπό να προσδιορισθεί η τάση θεραπείας της ΡΑ με βιολογικά και μη DMARDS . 1507 ασθενείς με εγκατεστημένη ΡΑ περιελήφθησαν στη μελέτη (1983-2009)

- Στο διάστημα 1983-2009 διαπιστώθηκε αύξηση της χρήσης κάθε DMARDs από το 71 στο 83% των ασθενών
- Το 2009, το **43% ελάμβανε βιολογικό DMARD**, το 34% συνδυασμό βιολογικού και κλασσικού ενώ το 40% μόνο μη βιολογικό DMARD
- Τα πιο συνηθισμένα μη-βιολογικά DMARDs ήταν : MTX (49%), hydroxychloroquine (30%), leflunomide (13%) και sulfasalazine (7%)
- Τα πιο συνηθισμένα βιολογικά DMARDs ήταν : Etanercept (20%), infliximab (10%), adalimumab (9%) and abatacept (6%)
- Από του στόματος στεροειδή χορηγούταν συχνά (40%-50%) και αυτό δεν άλλαξε στην υπο μελέτη περίοδο των 25 ετών

*Changes in use of disease modifying anti-rheumatic drugs for rheumatoid Arthritis in the U.S. for the period 1983-2009. Kim SC, Yelin E, Tonner C, **Solomon** DH. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013 Article first published online: **26 AUG** 2013;10.1002/acr.21997. [Epub ahead of print]*