



Συγχορήγηση βιολογικών με Denosumab (part II, 1354 ασθενείς)



Δεδομένα από μια ομάδα ασθενών με RA υπό βιολογικό παράγοντα που ξεκίνησαν αγωγή και με denosumab (n=1.354, οι περισσότεροι υπό infliximab ή abatacept) ή zoledronic acid (n=4.460)

Αν και οι ασθενείς υπό denosumab είχαν στο παρελθόν περισσότερες λοιμώξεις και μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη λοίμωξης, **η συχνότητα για νοσηλεία λόγω λοίμωξης ήταν παρόμοια με αυτή ασθενών με zoledronic acid (14.9/100py; 95% CI 12.2-18.1 Vs 13.9/100py; 95% CI 12.5-15.4) (HR=0.89, 95% CI 0.69 - 1.15)**

Risk of Hospitalized Infection among Biologic-Treated Rheumatoid Arthritis Patients Concurrently Treated with Denosumab. Curtis JR1, Xie F, Yun H, Saag KG, Chen L, Delzell E. Arthritis Rheumatol. 2015 Feb 23. doi: 10.1002/art.39075. [Epub ahead of print]

Συγχορήγηση βιολογικών με Denosumab , part I

http://www.ere.gr/newsletter_news/21112014_1.pdf

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη