
Μεθοτρεξάτη λουπόν...σε κάθε αρθρίτιδα ?

Annals of the
RHEUMATIC DISEASES
The EULAR Journal

Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη όπου 144 ασθενείς με **πρωτοπαθή ΟΑ** τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν MTX μέχρι 25 mg/εβδ ή εικονικό φάρμακο

- στην ομάδα της MTX παρατηρήθηκε **μείωση σε παραμέτρους όπως ο πόνος** στο γόνατο, η φυσική δραστηριότητα ή τις καθημερινές δραστηριότητες στις 28 εβδομάδες σε σχέση με το placebo, με αντίστοιχη μέση διαφορά 11.4 (2.8 - 20.0) $p=0.009$, 9.5 (3.7 - 15.3) $p=0.001$ και 1.2 (0.1 - 2.3), $p=0.032$
- Παρατηρήθηκε επίσης στις 28 εβδομάδες **μείωση της υμενίτιδας** (κλινικά και υπερηχογραφικά) στην ομάδα του φαρμάκου σε σχέση με το placebo
- Σχετικά με το ποσοστό των ασθενών που είχαν > 20% βελτίωση στο VAS πόνου, μεγαλύτερο ήταν στην ομάδα υπό MTX (53%) σε σχέση με το placebo (24%)

Methotrexate in the treatment of symptomatic knee osteoarthritis: randomised placebo-controlled trial. Abou-Raya A1, Abou-Raya S, Khadrawe T. Ann Rheum Dis. 2014 Mar 27. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204856. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη