
αντι-TNF-α αγωγή μετά από TB επαγόμενη από αντι-TNF-α

RHEUMATOLOGY

Από τα αρχεία 683 ασθενών ενός ρευματολογικού κέντρου ανασύρθηκαν δεδομένα 13 ασθενών που ανέπτυξαν ενεργό TB, 20 μήνες κατά μέσο όρο, μετά την έναρξη αντι-TNF-α θεραπείας

- Σε 6 από αυτούς έγινε επανέναρξη αντι-TNF-α θεραπείας, εκ των οποίων, σε 4 ασθενείς 2 μήνες μετά την έναρξη της αντι-TB αγωγής και σε 2 ασθενείς μετά το τέλος της αντι-TB αγωγής
- Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης κατά μέσο όρο 30 μηνών, **όλοι οι ασθενείς αντιμετώπιστηκαν με επιτυχία με την αντι-TNF-α θεραπεία, χωρίς υποτροπή της TB**

Safety of resuming tumour necrosis factor inhibitors in patients who developed tuberculosis as a complication of previous TNF inhibitors. Kim YJ, Kim YG, Shim TS, Koo BS, Hong S, Lee CK, Yoo B. Rheumatology (Oxford). 2014 Mar 27. [Epub ahead of print].

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη