


---

---

## Αλλοπουρινόλη στην Ασυμπτωματική υπερουριχαιμία? κι όμως !

---

---



176 ασθενείς με ΣΔ ΙΙ και ασυμπτωματική υπερουριχαιμία τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες, με χορήγηση αλλοπουρινόλης ή συμβατικής θεραπείας . Μετά από 3 χρόνια θεραπείας:

- Η αλλοπουρινόλη, σε σχέση με την συμβατική θεραπεία, ήταν πιο αποτελεσματική στη μείωση του UA , στην μείωση της κρεατινίνης ορού και στην αύξηση της GFR
- Στην ομάδα της αλλοπουρινόλης, η επίπτωση νεοεμφανιζόμενης διαβητικής νεφροπάθειας και ΑΥ είχε μια μειωμένη τάση, αν και αυτό δεν ήταν στατιστικά σημαντικό

Φαίνεται έτσι ότι η αλλοπουρινόλη **βελτιώνει την νεφρική λειτουργία** σε ασθενείς με ΣΔ και ασυμπτωματική υπερουριχαιμία

*Allopurinol treatment improves renal function in patients with type 2 diabetes and asymptomatic hyperuricemia: a three years of randomized parallel-controlled study. Liu P, Chen Y, Wang B, Zhang F, Wang D, Wang Y. Clin Endocrinol (Oxf). 2014 Nov 17. doi: 10.1111/cen.12673. [Epub ahead of print]*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη