

---

---

## Πόσο η φλεγμονή επηρεάζει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο?

---

---

Annals of the  
**RHEUMATIC DISEASES**  
The EULAR Journal

Αναδρομική εκτίμηση **44.418 ασθενών με RA**:

- Παρουσία CRP > 10 mg/L σχετίστηκε, σε σχέση με CRP < 1, με αυξημένο κίνδυνο για OEM (HR 2.12, 95% CI 1.02 - 4.38)
- Παρουσία TKE ≥ 42 σχετίστηκε, σε σχέση με TKE < 14, με αυξημένο κίνδυνο για OEM (HR 2.53, 95% CI 1.48 - 4.31) και AEE (HR 2.51, 95% CI 1.33 - 4.75)
- HDL-cholesterol ≥ 60 mg/dL σχετίστηκε, σε σχέση με < 40 mg/dL, με μειωμένο κίνδυνο για OEM (HR 0.37, 0.21 - 0.66)
- Η σχέση μεταξύ LDL και OEM δεν ήταν γραμμική. Ο μικρότερος κίνδυνος φάνηκε για ασθενείς με LDL μεταξύ 70 mg/L και 100 mg/L, ενώ δεν φάνηκε σημαντική σχέση μεταξύ LDL και AEE

Η σχέση μεταξύ φλεγμονής και καρδιαγγειακού κινδύνου είναι ξεκάθαρη, ενώ πιο σύνθετη φαίνεται να είναι η σχέση μεταξύ LDL και του ίδιου κινδύνου

*The association between inflammatory markers, serum lipids and the risk of cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis. Zhang J, Chen L, Delzell E, Muntner P, Hillegass WB, Safford MM, Millan IY, Crowson CS, Curtis JR. Ann Rheum Dis. 2014 Jul;73(7):1301-1308. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204715. Epub 2014 May 5*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη