

---

---

## Πως η ηλικία έναρξης επηρεάζει την εικόνα του σκληροδέρματος

---

---

### Medicine

Ανάλυση δεδομένων από το Spanish Scleroderma Study Group με 1037 ασθενείς όπου ανάλογα με την ηλικία έναρξης της νόσου, αυτοί χωρίστηκαν σε 3 ομάδες (πρώιμη έναρξη : < 30 ετών με 195 ασθενείς, > 30 αλλά < 60 : κλασσική έναρξη με 651 ασθενείς και >60: όψιμη έναρξη με 191 ασθενείς)

- Οι ασθενείς με πρώιμη έναρξη είχαν μεγαλύτερη συχνότητα προσβολής οισοφάγου (72% Vs 67% Vs 56%) και μυοσίτιδα (11%, 7,2%, 2.9%) αλλά μικρότερη συχνότητα κεντρομεριδιακών αντισωμάτων (33%, 46%, and 47%)
- Ασθενείς με αψώτερης έναρξης σκληρόδεμα είχαν μικρότερη συχνότητα δακτυλικών ελκών (54%, 41%, 34%) αλλά μεγαλύτερη συχνότητα διαταραχών καρδιακής αγωγής (9%, 13%, 21%)
- Πνευμονική υπέρταση διαπιστώθηκε στο 25% των ηλικιωμένων ασθενών και στο 12% των νεότερων
- Η θνησιμότητα (SMR) φάνηκε να είναι υψηλότερη στους πιο νέους ασθενείς

*Early- versus Late-Onset Systemic Sclerosis: Differences in Clinical Presentation and Outcome in 1037 Patients. Alba, Marco A. MD; Velasco, César MD; Simeón, Carmen Pilar MD; Fonollosa, Vicent MD; Trapiella, Luis MD; Egurbide, María Victoria MD; Sáez, Luis MD; Castillo, María Jesús MD; Callejas, José Luis MD; Camps, María Teresa MD; Tolosa, Carles MD; Ríos, Juan José MD; Freire, Mayka MD; Vargas, José Antonio MD; Espinosa, Gerard MD, PhD; the RESCLE Registry Medicine. **March 2014** - Volume 93 - Issue 2 - p 73–81 doi: 10.1097/ MD.00000000000018*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη