
DVT στην ΡΑ - καιρός να ασχοληθούμε σοβαρά



Έρευνα σε βάσεις δεδομένων όπως MEDLINE, EMBASE και Cochrane με **συστηματική ανασκόπηση & μετανάλυση** 9 τελικά μελετών παρατήρησης

- Ο συνολικός κίνδυνος για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή και φλεβική θρομβοεμβολική νόσο για ασθενείς με ΡΑ ήταν αντίστοιχα 2.08 (95 % CI 1.75–2.47), 2.17 (95 % CI 2.05–2.31) και 1.96 (95 % CI 1.81–2.11) σε σχέση με άτομα χωρίς ΡΑ
- Σταθερά αυξημένος κίνδυνος διαπιστώθηκε σε κάθε τύπου μελέτη (cohort, case–control, cross-sectional)

Με βάση τα ευρήματα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει **σημαντικά αυξημένος κίνδυνος** για φλεβική θρομβοεμβολική νόσο στους ασθενείς με ΡΑ

Risk of venous thromboembolism in patients with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. Patompong Ungprasert, Narat Srivali, Ittikorn Spanuchart, Charat Thongprayoon, Eric L. Knight Clinical Rheumatology March 2014, Volume 33, Issue 3, pp 297-304

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη