

Διακοπή βιολογικών παραγόντων σε RA ασθενείς σε ύφεση

Μελέτη παρατήρησης 24 εβδομάδων 50 RA ασθενών που πέτυχαν ύφεση (DAS28 ESR < 2,6) διάρκειας τουλάχιστον 24 εβδομάδων, μετά από συνδυαστική αγωγή με adalimumab (ADA) και MTX και με τη δική τους θέληση, διέκοψαν τον βιολογικό παράγοντα

- 29 ασθενείς **(58%) παρέμειναν σε ύφεση** 24 εβδομάδες μετά τη διακοπή του ADA
- Το αρχικό DAS28 (ESR) ήταν ο πιο σημαντικός δείκτης πρόβλεψης για διατήρηση της ύφεσης μετά την ADA διακοπή
- 6 μήνες μετά τη διακοπή το HAQ-DI ADA ήταν 0,1
- Το **94.9% (37/39) των ασθενών δεν είχαν στοιχεία ακτινολογικής επιδείνωσης** στο 1^ο χρόνο

Discontinuation of adalimumab after attaining disease activity score 28- erythrocyte sedimentation rate remission in patients with rheumatoid arthritis (HONOR study): an observational study
Shintaro Hirata, Kazuyoshi Saito, Satoshi Kubo, Shunsuke Fukuyo, Yasushi Mizuno, Shigeru Iwata et al.
Arthritis Research & Therapy 2013, 15:R135 (25 September 2013)

Το πλήρες άρθρο ελεύθερα :

http://arthritis-research.com/content/15/5/R135?utm_campaign=13_11_13_arthritisres_etoc_15_5&utm_content=7388963218&utm_medium=BMCemail&utm_source=Emailvision

Σχετικά άρθρα στο EREnews:

[Μείωση δόσης anti-TNF -α σε AS ασθενείς σε ύφεση](#)

Το ενημερωτικό κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.
Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης