
Συγχορήγηση denosumab με βιολογικούς



Με βάση αναδρομική μελέτη διάρκειας 4 ετών σε 136 ασθενείς ενός κέντρου, η χορήγηση denosumab σε ασθενείς με ΡΑ **δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων** όταν χορηγείται σε συνδυασμό με βιολογικούς παράγοντες, σε σχέση με τον βιολογικό μόνο του. Το ίδιο ισχύει και για σοβαρές λοιμώξεις, διακοπή θεραπείας ή νοσοκομειακές νοσηλίες

- Οι βιολογικοί παράγοντες ήταν infliximab, tocilizumab, rituximab, belimumab, abatacept, adalimumab, golimumab
- Ο κίνδυνος για λοιμώξεις με τον συνδυασμό denosumab & βιολογικό ήταν παρόμοιος με τον κίνδυνο των βιολογικών όταν χορηγούταν μόνοι τους (*RR: 1.24, 95% CI 0.76-2.04*)
- Οι ασθενείς πάντως που έλαβαν μόνο denosumab είχαν λιγότερες λοιμώξεις σε σχέση με αυτούς που έλαβαν μόνο βιολογικό ή αυτούς που έλαβαν συνδυασμό denosumab & βιολογικό

Prabhakaran S, Pritchard C "Comparison of infection rates in patients receiving denosumab, denosumab and biologics and biologics alone in a suburban rheumatology clinic" ACR 2014; Abstract 921.

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη