

---

---

## Περιφερική αρθρίτιδα στην AS - όχι τόσο άσχημα όσο ακούγεται

---

---

### RHEUMATOLOGY

363 ασθενείς με AS και περιφερική αρθρίτιδα συγκρίθηκαν με 522 ασθενείς με AS χωρίς περιφερική αρθρίτιδα (Observation Study of the Korean SpA Registry)

- Σε απλή σύγκριση, διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στο mSASSS score (*modified Stoke AS Spinal Score* : ακτινολογική δομική βλάβη) μεταξύ ασθενών με ιστορικό περιφερικής αρθρίτιδας και χωρίς [*mean 14.62 (s.e.m. 0.83) vs 18.78 (0.79), P < 0.001*]
- Μετά από προσαρμογή, φάνηκε ότι οι ασθενείς με **περιφερική αρθρίτιδα είχαν μικρότερη αλλαγή στο mSASSS score** σε σχέση με αυτούς χωρίς περιφερική αρθρίτιδα [*3.08 (s.e.m. 0.61) vs 5.18 (0.47), P = 0.008*], εύρημα συμβατό με το γεγονός ότι η παρουσία περιφερικής αρθρίτιδας ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ την ακτινογραφική εξέλιξη της AS

*The presence of peripheral arthritis delays spinal radiographic progression in ankylosing spondylitis: Observation Study of the Korean Spondyloarthritis Registry. Kim TJ1, Lee S, Joo KB, Park DJ, Park YW, Lee SS, Kim TH. Rheumatology (Oxford). 2014 Mar 7. [Epub ahead of print]*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη