
Μείωση UA < 5 σε όλους τους ασθενείς, σε 21 ημέρες !

RHEUMATOLOGY

Φάσης IB πολυκεντρική μελέτη σε ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα και ουρικό > 8 mg/dl, οι οποίοι έλαβαν **Febuxostat 40 ή 80 mg/day τις ημέρες 1–21 και lesinurad (εκλεκτικός αναστολέας επαναρρόφησης UA) 400 mg/day που προστέθηκε τις ημέρες 8–14 ενώ στη συνέχεια έγινε αύξηση στο lesinurad στα 600 mg/day για τις ημέρες 15–21**

- Η αρχική μονοθεραπεία με febuxostat 40 ή 80 mg/day είχε ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί sUA level <6 mg/dl στο 67% και 56% των ασθενών αντίστοιχα
- Χορήγηση Febuxostat 40 ή 80 mg/day με lesinurad 400 ή 600 mg/day είχε ως αποτέλεσμα sUA <6 mg/dl να επιτευχθεί στο 100% των ασθενών όπως και sUA <5 mg/dl στο 100% των ασθενών
- Δεν διαπιστώθηκαν αλλαγές στη φαρμακοκινητική των 2 φαρμάκων και ο συνδυασμός ήταν καλά ανεκτός

Pharmacodynamic, pharmacokinetic and tolerability evaluation of concomitant administration of lesinurad and febuxostat in gout patients with hyperuricaemia. Fleischmann R, Kerr B, Yeh LT, Suster M, Shen Z, Polvent E, Hingorani V, Quart B, Manhard K, Miner JN, Baumgartner S; on behalf of the RDEA594-111 Study Group. Rheumatology (2014) 53 (12): 2167-2174. doi: 10.1093/rheumatology/ket487

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη