



15-06-2023

OXFORD
ACADEMIC

RHEUMATOLOGY

JOURNAL ARTICLE ACCEPTED MANUSCRIPT

Predictors of DAPSA28 remission in patients with psoriatic arthritis initiating a first TNF-inhibitor: results from 13 European registries

Louise Linde , Lykke M Ørnbjerg, Stylianos Georgiadis, Simon H Rasmussen, Ulf Lindström, Johan Askling, Brigitte Michelsen, Daniela Di Giuseppe, Johan K Wallman, Bjorn Gudbjornsson ... [Show more](#)

Σκοπός-Μέθοδοι

- Σκοπός της μελέτης ο εντοπισμός των προγνωστικών παραγόντων επίτευξης ύφεσης και μέτριας ανταπόκρισης κατά DAPSA (28 αρθρώσεων) στους 6 και 12 μήνες, ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) που δεν έχουν λάβει βιολογική θεραπεία και ξεκινούν έναν αναστολέα του TNF.
- Εξετάστηκαν δεδομένα ασθενών από 13 Ευρωπαϊκά μητρώα.

Αποτελέσματα

- Στη συγκεντρωτική κοόρτη (n = 13 369), τα ποσοστά ύφεσης σε έξι μήνες, μέτριας ανταπόκρισης και 12μηνιαίας διατήρησης του φαρμάκου ήταν 25%, 34% και 63% σε ασθενείς με διαθέσιμα δεδομένα (n = 6.954, n = 5,275 = 13 369, αντίστοιχα).
- Αντίστοιχα προσδιορίστηκαν οι βασικοί προγνωστικοί παράγοντες, από τους οποίους οι πέντε ήταν κοινοί και στις τρεις εκβάσεις.
- Το OR (95% διάστημα εμπιστοσύνης) για την ύφεση του DAPSA 28 ήταν: ηλικία, (ανά έτος) : 0,97 (0,96–0,98). διάρκεια νόσου, έτη (< 2 έτη ως αναφορά): 2–3 έτη: 1,20 (0,89–1,60), 4–9 έτη: 1,42 (1,09–1,84), ≥10 έτη: 1,66 (1,26–2,20); άνδρες vs γυναίκες: 1,85 (1,54–2,23); CRP >10 έναντι ≤ 10 mg/l: 1,52 (1,22–1,89) και κατά ένα mm αύξηση στη βαθμολογία κόπωσης του ασθενούς (VAS): 0,99 (0,98–0,99).

Συμπεράσματα

- Το ανδρικό φύλο, η μεγαλύτερη διάρκεια νόσου και η υψηλότερη CRP αποδείχτηκαν θετικοί προγνωστικοί παράγοντες επίτευξης ύφεσης και μέτριας ανταπόκρισης στους 6 μήνες θεραπείας αλλά και στη 12μηνιαία διατήρηση του φαρμάκου.
- Αντίθετα, η μεγαλύτερη ηλικία και τα μεγαλύτερα επίπεδα στα ερωτηματολόγια της κόπωσης, ήταν αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες.

<https://doi.org/10.1093/rheumatology/kead284>