




ACPA στο σκληρόδερμα



Αντισώματα έναντι κιτρολινοποιημένων πεπτιδίων (*antibodies to citrullinated peptide antigens -ACPA*) ανευρίσκονται στο 9,2% των ασθενών με συστηματική σκλήρυνση (σκληρόδερμα) και η παρουσία τους σχετίζεται

κυρίως με διαβρωτική αρθρίτιδα, και λιγότερο με πνευμονική ίνωση, προσβολή οισοφάγου ή διάχυτη προσβολή δέρματος.

Τα ευρήματα προέρχονται από **συστηματική ανασκόπηση** της βιβλιογραφίας, περιλαμβάνοντας 13 μελέτες παρατήρησης με συνολικά 1.231 ασθενείς με σκληρόδερμα.

Anti-citrullinated peptides antibodies in systemic sclerosis: Meta-analysis of frequency and meaning. Laustriat G1, Ruyssen-Witrand A2, Constantin A3, Barnetche T4, Adoue D5, Cantagrel A3, Degboé Y6. Joint Bone Spine. 2018 Mar;85(2):147-153. doi: 10.1016/j.jbspin.2017.11.006

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

[ACPA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ 5,3% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΑ](#)

[ANTI-CCP ΣΤΟΝ ΣΕΛΑ \(7/14\)](#)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.