




Φλεβική θρόμβωση με JAK αναστολείς ?

Στο ερώτημα αν σε ασθενείς με PA, το **tofacitinib** ή οι **TNFi** σχετίζονται με μεγαλύτερο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου, σύμφωνα με δεδομένα από το Truven

MarketScan database και το Medicare (50.865 συνολικά ασθενείς)¹, η απάντηση είναι ότι:

- η εμφάνιση μιας τέτοιας επιπλοκής δεν είναι συχνή (<1 /100 person-years)
- η έναρξη αγωγής με **tofacitinib** **σχετίζεται με ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ μεγαλύτερο κίνδυνο, χωρίς κάτι τέτοιο να φτάνει την στατιστική σημαντικότητα**



Σχετικά με τον ίδιο κίνδυνο σε ασθενείς με PA υπό Baricitinib, σύμφωνα με δεδομένα από 9 RCTs μελέτες χορήγησης του φαρμάκου (3.492 ασθενείς / 7.860 patient-

years) διαπιστώθηκαν μόλις **6 περιστατικά**, όταν όμως στην ομάδα του **εικονικού φαρμάκου δεν διαπιστώθηκε κανένα** ².



1. *Comparative Risk of Venous Thromboembolism in Rheumatoid Arthritis Patients Receiving Tofacitinib Versus Those Receiving Tumor Necrosis Factor Inhibitors: An Observational Cohort Study.* Desai RJ, Pawar A et al. *Arthritis Rheumatol.* **2019 Jun**;71(6):892-900. doi: 10.1002/art.40798.
2. *Cardiovascular Safety During Treatment With Baricitinib in Rheumatoid Arthritis.* Taylor PC, Weinblatt ME et al. *Arthritis Rheumatol.* **2019 Jan 21.** doi: 10.1002/art.40841

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.