



Θεραπεία δερματικής προσβολής στο σκληρόδερμα

BMJ Journals Subscribe Log In Basket search Search Advanced search

Annals of the **Rheumatic Diseases** Latest content Current Issue Archive Authors About

Home / Online First Email alerts

Article Text PDF

Clinical and epidemiological research
Extended report

Treatment outcome in early diffuse cutaneous systemic sclerosis: the European Scleroderma Observational Study (ESOS)

Article info

Δεδομένα από την ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ μελέτη παρατήρησης ESOS (*European Scleroderma Observational Study*) με **326 ασθενείς με πρώιμης μορφής (< 3 χρόνια) διάχυτο σκληρόδερμα (dcSSc)**

Η βελτίωση στη δερματική προσβολή στους 12 μήνες αγωγής, σύμφωνα με το modified Rodnan skin score (mRSS), ήταν στατιστικά σημαντική, αλλά **μέτρια σε αποτελεσματικότητα**, με όλες και τις παρεμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα. μείωση :

- 4.0 (-5.2 έως -2.7) μονάδες με **methotrexate**
- 4.1 (-5.3 έως -2.9) με **MMF**
- 3.3 (-4.9 έως -1.7) με cyclophosphamide
- 2.2 (-4.0 έως -0.3) χωρίς κάποιο ανοσοκατασταλτικό (*p value for between-group differences=0.346*)



[ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ](#)

Treatment outcome in early diffuse cutaneous systemic sclerosis: the European Scleroderma Observational Study (ESOS). Herrick AL1,2, Pan X3, Peytrignet S3, et al. Ann Rheum Dis. 2017 Feb 10. pii: annrheumdis-2016-210503. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210503. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη.