




Θνησιμότητα νεφρικής νόσου τελικού σταδίου στον ΣΕΛ



Στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ με ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD), ανευρέθηκαν για το διάστημα 1995-2014, **20.974 άτομα**

με ESRD από ΣΕΛ.

Η θνησιμότητα (/100 ασθενο-ετη) φάνηκε να **μειώνεται** :

- από το 11.1 (95% CI 10.4-11.8) για το διάστημα 1995-1999
- σε 6.7 (95% CI 6.2-7.2) για το διάστημα 2010-2014 (p trend <0.01)

Συγκριτικά με την περίοδο 1995-1999, ο προσαρμοσμένος κίνδυνος θνησιμότητας διακυμάνθηκε στο τελευταίο διάστημα, για τη λευκή φυλή, στο 0.68 (95% CI 0.58-0.78).

Συγκρίνοντας τις δύο περιόδους, οι θάνατοι καρδιαγγειακής αιτιολογίας ή από λοιμώξεις μειώθηκαν κατά 44% και 63% αντίστοιχα (και για τα δύο, p trend <0.01)

All-Cause and Cause-Specific Mortality Trends of End-Stage Renal Disease due to Lupus Nephritis from 1995 to 2014. Jorge A, Wallace Z1, Zhang Y, Lu N, Costenbader KH, Choi HK. Arthritis Rheumatol. 2018 Sep 18. doi: 10.1002/art.40729. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη
Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο