




Τοπικά νιτρώδη στο φ. Raynaud



Η εφαρμογή τοπικών διαλυμάτων με νιτρώδη σε ασθενείς με 1θες ή 2θες φαινόμενο Raynaud φαίνεται να αποτελεί μια σημαντικά αποτελεσματική παρέμβαση στην αντιμετώπιση του,

σύμφωνα με πρόσφατη **συστηματική**

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, με 7 RCTs μελέτες και 346 ασθενείς να περιλαμβάνονται στην μετανάλυση:

- μελετηθηκαν αλοιφές νιτρογλυκερίνης, MQX-503 ή compounded nitrite
- διαπιστώθηκε **μέτρια-σοβαρή θεραπευτική δράση** ($SMD=0.70$, $(0.35 - 1.05$, $p<0.0001$)), κυρίως στο 2θες φαινόμενο Raynaud ($SMD=0.95$ $(0.25 - 1.65$, $p=0.008$)

A Systematic Review and Meta-Analysis of the Effects of Topical Nitrates in the Treatment of Primary and Secondary Raynaud's Phenomenon. Curtiss P, Schwager Z, Cobos G, Lo Sicco K, Franks AG Jr.. J Am Acad Dermatol. 2018 Feb 2. pii: S0190-9622(18)30172-5. doi: 10.1016/j.jaad.2018.01.043. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.