



ΨΑ σε ασθενείς με ψωρίαση στην Ελλάδα



Ο επιπολασμός της ΨΑ μεταξύ ασθενών με ψωρίαση στην Ελλάδα φαίνεται να είναι σχετικά υψηλός σε σχέση με άλλα έθνη, σύμφωνα με πρόσφατη αναδρομική μελέτη με 278 ασθενείς με

ψωρίαση, όπου **85 ασθενείς (30%) είχαν ΨΑ**. Από τους

ασθενείς με ΨΑ :

- το 51% είχε προσβολή ονύχων
- το 51% παρουσίασε πολυαρθρίτιδα, το 12% oligo-αρθρίτιδα και 8% αξονική προσβολή, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (31%) παρουσίασε αρθρίτιδα με μεικτό τύπο
- σε σχέση με ασθενείς χωρίς αρθρίτιδα, σημαντικό ποσοστό παρουσίασε συνοσηρότητες (ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία)

Prevalence of psoriatic arthritis and its correlates among patients with psoriasis in Greece: results from a large retrospective study. Papadavid E1, Katsimbri P2, Kapniari I1, Koumaki D1, Karamparpa A1, Dalamaga M3, Tzannis K4, Boumpas D2, Rigoropoulos D1. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 Aug 10. doi: 10.1111/jdv.13700. [Epub ahead of print]

[ΔΕΙΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ](#)

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης

και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης **εύρημα μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη