



Ψύχωση στον ΣΕΛ

Δεδομένα από μια
πολύ-εθνική,
προοπτικής
παρακολούθησης,
κοόρτη, με **1.826**
ασθενείς με ΣΕΛ
(88.8% γυναίκες,

48.8% καυκάσιοι. μέσης ηλικίας

35.1±13.3 ετών, και διάρκειας νόσου 5.6±4.2 μήνες και παρακολούθησης 7.4±4.5 έτη).

- διαπιστώθηκαν 31 συμβάματα ψύχωσης σε 28/1.826 (**1.53%**) ασθενείς
- στις περισσότερες περιπτώσεις τα επεισόδια ήταν **μονήρη** [(26/28 - 93%)]
- και εμφανίστηκαν μέσα στα **πρώτα 3 χρόνια από τη διάγνωση** του ΣΕΛ
- θετική συσχέτιση φάνηκε με :
 - προηγούμενα νευροψυχιατρικά συμβάματα [3.59, (1.16, 11.14)]
 - άρρεν φύλο [3.0, (1.20, 7.50)]
 - μικρότερη ηλικία διάγνωσης [1.45 (1.01, 2.07)]
 - Αφρικανική καταγωγή [4.59 (1.79, 11.76)]

Hanly, J. G., Li, Q., Su, L., Urowitz, M. B., et al.. (2018), Psychosis in Systemic Lupus Erythematosus. *Arthritis Rheumatol.* Accepted Author Manuscript. First published: **30 October 2018**.
doi:10.1002/art.40764

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.