




## RTX στο σκληρόδερμα



Προοπτική μελέτη (παρατήρησης και όχι τυχαιοποιημένη) από την ομάδα εργασίας **EUSTAR** (*European Scleroderma Trials and Research*) με

**254** ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση, εκ των οποίων οι περισσότεροι (58%) έλαβαν Rituximab (RTX) για πνευμονική προσβολή. Η μελέτη έδειξε καλό προφίλ ασφάλειας, σημαντική **βελτίωση στο θέμα του δέρματος αλλά όχι στο θέμα του πνεύμονα**. Πιο συγκεκριμένα, και σε διάστημα 2 ετών:

- το 70% των ασθενών δεν παρουσίασε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια
- δεν φάνηκαν σημαντικές μεταβολές στην μείωση του FCV (FVC >10% (OR: 1.03 [0.55–1.94],  $p=0.93$ ) ή του DLCO
- αυξημένη πιθανότητα για βελτίωση στην δερματική προσβολή (OR: 2.79 [1.47–5.32];  $p=0.002$ )
- μια τάση για καλύτερη έκβαση σε ασθενείς με συνδυαστική αγωγή με mycophenolate mofetil, σε σχέση με ασθενείς με μονο-θεραπεία με RTX

*Elhai M, Boubaya M, Distler O, et al Outcomes of patients with systemic sclerosis treated with rituximab in contemporary practice: a prospective cohort study Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 09 April 2019. doi: 10.1136/annrheumdis-2018-214816*

### [...ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ](#)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της **ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ** και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.