
Νεοπλασίες στην ΡΑ (μετανάλυση)



Και στην τελευταία αυτή συστηματική ανασκόπηση & μετανάλυση, με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της βιβλιογραφίας (9 μελέτες παρατήρησης από 2008-2014), επιβεβαιώνονται τα ευρήματα παλαιότερων μελετών, όπου ασθενείς με ΡΑ βρίσκονται σε

- **Μέτρια αυξημένο κίνδυνο συνολικά για καρκίνο** σε σχέση με το γενικό πληθυσμό και αυτό ισχύει κυρίως για τον **καρκίνο πνεύμονα και το λέμφωμα**
- ο εκτιμώμενος κίνδυνος (SIR) για καρκίνο του παχέος εντέρου και μαστού συνεχίζει να παρουσιάζει μείωση
- ο κίνδυνος για καρκίνος του προστάτη και τραχήλου όπως και για το μελάνωμα δεν φαίνεται να παρουσιάζουν μια σταθερή τάση



Incidence of malignancy in adult patients with rheumatoid arthritis: a meta-analysis. Simon TA, Thompson A, Gandhi KK, Hochberg MC, Suissa S. Arthritis Res Ther. 2015 Aug 15;17(1):212. doi: 10.1186/s13075-015-0728-9

[ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ](#)

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη