



Στεροειδή στον ΣΕΛ & παγκρεατίτιδα

Corticosteroid-associated lupus pancreatitis: a case series and systematic review of the literature

P Dwivedi, R R Kumar, A Dhooria, more...

First Published April 25, 2019 | Research Article

<https://doi.org/10.1177/0961203319844004>

Show all authors



Η οξεία παγκρεατίτιδα είναι μια **σπάνια** επιπλοκή στον ΣΕΛ, με συχνότητα 0.85% - 4%, σε μερικούς όμως ασθενείς εμφανίζεται

ημέρες ή εβδομάδες μετά την έναρξη μέτριων

– υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών.

Στην συγκεκριμένη μελέτη, ελέγχθηκε μια κοόρτη με 420 εισαγωγές ασθενών με ΣΕΛ σε νοσοκομείο, εκ των οποίων 6 (1,4%) θα μπορούσαν να αποδοθούν σε οξεία παγκρεατίτιδα από κορτικοειδή (48-72 ώρες από την έναρξη τους).

Στην ίδια μελέτη έγινε και **ανασκόπηση της βιβλιογραφίας** με 451 περιστατικά με παγκρεατίτιδα σε ασθενείς με ΣΕΛ, εκ των οποίων στα 23 (5%) πληρούνταν τα κριτήρια για “corticosteroid-associated lupus pancreatitis”. Στους περισσότερους η έναρξη της παγκρεατίτιδας έγινε 3 ημέρες μετά την έναρξη των δόσεων κορτικοστεροειδών και η θνησιμότητα έφτασε το 37,5%.

Corticosteroid-associated lupus pancreatitis: a case series and systematic review of the literature.

Dwivedi P, Kumar RR et al *Lupus*. 2019 Apr 25:961203319844004. doi: 10.1177/0961203319844004.

[Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιληψής της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.