



## Εμβόλιο πνευμονιόκοκκου στην ΡΑ υπό βιολογικό



Η ορολογική  
απόκριση στον  
εμβολιασμό με  
PCV13  
ακολουθούμενο  
από PPV23

φαίνεται να είναι **παρόμοια**

**μεταξύ ασθενών με ΡΑ υπό βιολογικούς παράγοντες και ασθενών υπό κλασικά DMARDs. (87% Vs 94%).** Διαφορές όμως φαίνεται να υπάρχουν μεταξύ ασθενών με διαφορετικό βιολογικό, αφού η απόκριση σε **ασθενείς υπό rituximab ήταν μόλις 25% , σε σχέση με το 89%** των ασθενών υπό βιολογικό με άλλο μηχανισμό δράσης.

Η μελέτη αφορούσε 65 ασθενείς με ΡΑ υπό βιολογικό και 35 υπό csDMARDs, ενώ ως πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η απόκριση σε  $\geq 6/12$  ορότυπους πνευμονιόκοκκου, 4 εβδομάδες μετά τους 2 εμβολιασμούς.

*Initial Serological Response after Prime-boost Pneumococcal Vaccination in Rheumatoid Arthritis Patients: Results of a Randomized Controlled Trial. Mai T.T. Nguyen, Hanne Lindegaard, Oliver Hendricks, Charlotte Sværke Jørgensen, Bjørn Kantsø and Nina Friis-Møller. The Journal of Rheumatology **October 2017**, jrheum.161407; DOI: <https://doi.org/10.3899/jrheum.161407>*

### **ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ**

[ΣΕΛ & ΑΝΟΣΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ \(ΣΥΣΤ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 9/16\)](#)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.