



Έναρξη βιολογικού & αντικαταθλιπτικά

Είναι η **1^η μελέτη** σύμφωνα με την οποία φάνηκε ότι η έναρξη αλλά και η αλλαγή σε άλλον ενός βιολογικού παράγοντα σχετίζεται με διαταραχές στην

διάθεση και συγκεκριμένα με τη χορήγηση

αντικαταθλιπτικής ή αγχολυτικής αγωγής, κάτι που θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι κλινικοί.

Τα ευρήματα βασίζονται σε δεδομένα από το Ελληνικό αρχείο συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ) με:

- καταχώρηση για φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα για **42 815 ασθενείς** και συγκεκριμένα, για PA (n=27 462), Ψωριασική Αρθρίτιδα (n=8469) και ΑΣ (n=6883)
- **23 890 ασθενείς υπό βιολογικό** παράγοντα και συγκεκριμένα: PA (n=12 002), ΨΑ (n=5465), AS (n=6423)

Η **έναρξη** ενός βιολογικού παράγοντα σχετίστηκε με χορήγηση αντικαταθλιπτικών [OR: **1.248**, 95% CI 1.153 - 1.350, p<0.0001] ή αγχολυτικών φαρμάκων [OR: 1.178, 95% CI 1.099 - 1.263, p<0.0001].

Κάτι παρόμοιο φάνηκε και με την **αλλαγή** του βιολογικού σε κάποιο άλλο : OR: **1.502**, 95% CI 1.370 - 1.646, p<0.0001] και [OR: 1.161, 95% CI 1.067 - 1.264, p=0.001] αντίστοιχα .

Bournia V, Tektonidou MG, Vassilopoulos D, et al Introduction and switching of biologic agents are associated with antidepressant and anxiolytic medication use: data on 42 815 real-world patients with inflammatory rheumatic disease. RMD Open 2020;6:e001303. doi: 10.1136/rmdopen-2020-001303. Online issue publication September 25, 2020

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη
Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο