




Προκαλσιτονίνη στον ΣΕΛ



ΔΕΝ φαίνεται να υπάρχει διαφορά στα επίπεδα πλάσματος/ορού προκαλσιτονίνης μεταξύ ασθενών με ΣΕΛ και

έξαρση νόσου σε σχέση με ασθενείς με ΣΕΛ και λοίμωξη. Τα ευρήματα προέρχονται από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και **μετανάλυση** δεδομένων από 8 τελικά μελέτες, με 205 συνολικά ασθενείς με ΣΕΛ και έξαρση νόσου και 198 ασθενείς με ΣΕΛ και λοίμωξη.

Ανάλυση υπο-ομάδων έδειξε όμως ότι Ασιατικής καταγωγής ασθενείς με ΣΕΛ και λοίμωξη έχουν αυξημένα επίπεδα προκαλσιτονίνης, σε σχέση με ασθενείς με ΣΕΛ και έξαρση νόσου ($p < 0.001$)

Comparison of plasma/serum levels of procalcitonin between infection and febrile disease flare in patients with systemic lupus erythematosus: a meta-analysis. Li-Na Liu, Peng Wang, Shi-Yang Guan, Xiao-Mei Li, Bao-Zhu Li, Rui-Xue Leng, Hai-Feng Pan. Rheumatology International. First Online: 03 October 2017. <https://doi.org/10.1007/s00296-017-3827-x>

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Είναι εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.