
Amlodipine Vs Udenafil στο 2θες φαινόμενο Raynaud

RHEUMATOLOGY

Με σκοπό να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα του udenafil (ένας νέος phosphodiesterase type 5 αναστολέας, 100mg/d) με αυτή της amlodipine (calcium channel blocker, 10mg/d), 29 ασθενείς με 2θες φαινόμενο Raynaud σε έδαφος νοσήματος συνδετικού ιστού εισήχθησαν στη συγκεκριμένη μελέτη διάρκειας 4 εβδομάδων. Στη μελέτη αυτή, μετά από μια περίοδο χωρίς αγωγή (wash out), έγινε μεταξύ των 2 ομάδων, αλλαγή στη θεραπεία, για άλλες 4 εβδομάδες

- Και οι δύο θεραπευτικές επιλογές μείωσαν σημαντικά τη συχνότητα των επεισοδίων του Φαινομένου Raynaud
- **Δεν διαπιστώθηκε κάποια διαφορά μεταξύ των 2 φαρμάκων**, τόσο σχετικά με τη συχνότητα των επεισοδίων όσο και με άλλες παραμέτρους (πχ διαβάθμιση του φαινομένου, διάρκεια επεισοδίου, δακτυλικά έλκη, HAQ, σφαιρική εκτίμηση ιατρού). Διαφορά διαπιστώθηκε μόνο στην αιματική δακτυλική ροή, όπου το udenafil πέτυχε καλύτερα αποτελέσματα ($p=0,021$)
- Το udenafil ήταν καλά ανεκτό, χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες δράσεις

Head-to-head comparison of udenafil vs amlodipine in the treatment of secondary Raynaud's phenomenon: a double-blind, randomized, cross-over study. Lee EY1, Park JK, Lee W, Kim YK, Park CS, Giles JT, Park JW, Shin K, Lee JS, Song YW, Lee EB. Rheumatology (Oxford). 2014 Apr;53(4):658-64. doi: 10.1093/rheumatology/ket417

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη