

Εξω-αρθρικές εκδηλώσεις στην AS (συστημ. ανασκόπηση & μετα-ανάλυση)

Ραγοειδίτιδα, ψωρίαση και ΦΝΕ είναι μερικές από τις εξωαρθρικές εκδηλώσεις (ΕΑΕ) σε ασθενείς με AS. Δεδομένου ότι συνολικά δεδομένα επιπολασμού απουσιάζουν, έγινε μια προσπάθεια με αναζήτηση στη βιβλιογραφία ((Medline, Embase and Cochrane Library) ώστε να διαπιστωθεί η συχνότητα αλλά και οι υποκείμενοι παράγοντες των εκδηλώσεων αυτών .

- ανεβρέθησαν 156 άρθρα , εκ των οποίων, 143 ανέφεραν επιπολασμό ραγοειδίτιδας (44372 ασθενείς), 56 ψωρίασης (27626), και 69 ΦΝΕ (30410). Γενικά παρατηρήθηκε ετερογένεια σχετικά με τον επιπολασμό των ΕΑΕ, κάτι που εξηγείται εν μέρει από διαφορές σε κλινικά και μεθοδολογικά χαρακτηριστικά των μελετών
- ο συνολικός επιπολασμός της **ραγοειδίτιδας ήταν 25.8%** (95% CI 24.1% - 27.6%), η οποία σχετίστηκε με τη διάρκεια νόσου
- ο συνολικός επιπολασμός της **ψωρίασης ήταν 9,3** (95% CI 8.1% - 10.6%)
- Ο συνολικός επιπολασμός **ΦΝΕ ήταν 6.8%** (95% CI 6.1% - 7.7%) και σχετίστηκε θετικά με την παρουσία γυναικών στις μελέτες
- Η γεωγραφική περιοχή σχετίστηκε με τον επιπολασμό όλων των ΕΑΕ

Prevalence of extra-articular manifestations in patients with ankylosing spondylitis: a systematic review and meta-analysis. Stolwijk C, van Tubergen A, Castillo-Ortiz JD, Boonen A. Ann Rheum Dis. 2013 Sep 2. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203582. [Epub ahead of print]