



---

---

## Ρευματική πολυμυαλγία & καρκίνος: ο μύθος έχει βάση ?

---

---

Annals of the  
**RHEUMATIC DISEASES**  
The EULAR Journal

Στοιχεία από UK General Practice Research Database όπου 2.877 ασθενείς με ρευματική πολυμυαλγία (ΡΠ) ελέχθησαν με 9.942 συγκρίσιμους ασθενείς χωρίς ΡΠ

- Καρκίνος αναπτύχθηκε σε 667 (**23.2%**) ασθενείς με ΡΠ και σε 1938 (**19.5%**) άτομα χωρίς ΡΠ
- Στους πρώτους 6 μήνες διάγνωσης, οι ασθενείς με ΡΠ ήταν πιο πιθανό να διαγνωσθούν με καρκίνο (*adjusted HR (95% CI): 1.69 (1.18 - 2.42)*). Αυξημένος κίνδυνος για μεγαλύτερο διάστημα δεν ήταν δυνατό να καθορισθεί
- Αν και ο αριθμός των περιστατικών ήταν μικρός, περιπτώσεις καρκίνου προστάτη, αίματος, λεμφαδένων, αναπαραγωγικού συστήματος γυναικών και νευρικού συστήματος φαίνεται να είναι συχνές 6 μήνες μετά την διάγνωση ΡΠ
- Συνιστάται από τους συγγραφείς, πλήρης αποκλεισμός καρκίνου ως αιτίου για συμπτώματα παρόμοια της ΡΠ και παρακολούθηση των ασθενών για πιθανή ανάπτυξη κακοηθειών

*Is cancer associated with polymyalgia rheumatica? A cohort study in the General Practice Research Database.*  
Muller S1, Hider SL, Belcher J, Helliwell T, Mallen CD. *Ann Rheum Dis* Volume 73, Issue **10, October 2014**;73:1769-1773 doi:10.1136/annrheumdis-2013-203465

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη