



Μια ματιά στο μέλλον: αντι-IL 12/23 στην AS

Annals of the
RHEUMATIC DISEASES
The EULAR Journal

Προοπτική ανοιχτή μελέτη με χορήγηση ustekinumab 90 mg SC τις εβδομάδες 0-4-16, σε 20 ασθενείς με ενεργό AS. Την εβδομάδα 24:

- **ASAS40 απόκριση πέτυχε το 65%** των ασθενών. ASAS20, ASAS5/6 και ASAS μερική ύφεση παρατηρήθηκε στο 75%, 50% και 30% των ασθενών
- Βελτίωση $\geq 50\%$ στο BASDAI παρατηρήθηκε στο 55% των ασθενών
- 35% είχε ανενεργή νόσο (ASDAS < 1.3)
- Βελτιώσεις παρατηρήθηκαν και σε άλλες αναφερόμενες από τους ασθενείς παραμέτρους, όπως και στη φλεγμονή στην MRI ή τη λήψη ΜΣΑΦ
- Συνολικά, το φάρμακο ήταν καλά ανεκτό

Ustekinumab for the treatment of patients with active ankylosing spondylitis: results of a 28-week, prospective, open-label, proof-of-concept study (TOPAS). Poddubnyy D, Hermann KG, Callhoff J, Listing J, Sieper J. Ann Rheum Dis. 2014 Jan 3. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204248. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη

EREnewsPLUS+

[Έγκριση diclofenac sodium τοπικής εφαρμογής \(Pennsaid 2%, S: 1x2\)
από τον FDA για την ΟΑ γονάτου](#)