
Ποιός είναι ο πιο συχνός καρκίνος σε ασθενείς με αρθρίτιδα?



Στοιχεία από το Consortium of Rheumatology Researchers of North America (CORRONA) registry με 2.970 ασθενείς με ΨΑ με 7133 patient years (PY) παρακολούθηση και 19.260 RA ασθενείς με 53864 PY παρακολούθηση

- Διαπιστώθηκαν 40 επιβεβαιωμένα περιστατικά καρκίνου στην ΨΑ και 307 στην RA
- Η επίπτωση καρκίνου ανά 100 PY ήταν **ίδια μεταξύ ΨΑ και RA** (0,56)
- **Ο μη μελανωματικός καρκίνος δέρματος** ήταν ο πιο συχνός τύπος καρκίνου συνολικά στην κοόρτη αυτή (Incidence rate: 0,20 στην ΨΑ και 0,21 στην RA, με IRR 1,05)
- Η πιθανότητα λεμφώματος ήταν παρόμοια και στα δύο νοσήματα (0,04)

A comparison of malignancy incidence among psoriatic and rheumatoid arthritis patients in a large US cohort. Gross RL, Schwartzman-Morris JS, Krathen M, Reed G, Chang H, Saunders KC, Fisher MC, Greenberg JD, Putterman C, Mease PJ, Gottlieb AB, Kremer J, Broder A. Arthritis Rheumatol. 2014 Mar 3. doi: 10.1002/art.38385. [Epub ahead of print]

[ΔΕΝ αποσύρεται η ΔΙΑΣΠΕΪΝΗ αλλά συνιστάται προσοχή σε διάρροια και ηπατική βλάβη](#)

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη