

Νεφρίτιδα λύκου στην εγκυμοσύνη



11 εγκυμονούσες ασθενείς με ΣΕΛ υποβλήθηκαν σε βιοψία νεφρού για πιθανή έξαρση νεφρίτιδας λύκου, με μέση διάρκεια κύησης 16 εβδομάδων, κρεατινίνη ορού 0.6 mg/dl, 6 (55%) εκ των οποίων είχαν αιματουρία ενώ όλες είχαν πρωτεϊνουρία >500 mg/24ωρο

- Υπερπλαστική νεφρίτιδα διαπιστώθηκε σε 10/11 βιοψίες (5 με ISN/RPS Class III , 5 με ISN/RPS Class IV)
- Με βάση τα ευρήματα της βιοψίας, σε όλες, εκτός από μια, έγινε αλλαγή της θεραπευτικής αγωγής
- Καμία επιπλοκή δεν παρουσιάστηκε λόγω της βιοψίας στη μητέρα ή το έμβρυο
- Σε 3 γυναίκες έγινε τερματισμός της κύησης, λόγω διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων και τα ευρήματα της βιοψίας
- Σχετικά με τις υπόλοιπες περιπτώσεις: 3 ασθενείς είχαν πρώιμο τοκετό, 1 νεογνό παρουσίασε 1^{ου} βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό, παρουσιάστηκε ένας ενδομήτριος θάνατος ενώ μια ασθενής απεβίωσε

Renal biopsy in the management of lupus nephritis during pregnancy. Chen TK, Gelber AC, Witter FR, Petri M, Fine DM4. Lupus. 2014 Sep 23. pii: 0961203314551812. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη