

Αναστολείς ACE πριν από νεφρική κρίση

Προοπτική μελέτη με 87 ασθενείς με νεφρική κρίση σκληροδέρματος και παρακολούθηση ενός έτους σε 75 από αυτούς (86%):

- **27 ασθενείς (36%) πέθαναν στον 1ο χρόνο** ενώ επιπλέον 19 παρέμειναν σε διύλιση
- Η έκθεση σε αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης (angiotensin-converting enzyme (ACE)) πριν την έναρξη της νεφρικής κρίσης σχετίστηκε με **αυξημένο κίνδυνο για θάνατο** (*hazard ratio 2.42, 95% CI 1.02, 5.75, $p < 0.05$ στην 1η ανάλυση και 2.17, 95% CI 0.88, 5.33, $p = 0.09$ μετά από post-hoc προσαρμογή για προϋπάρχουσα υπέρταση*)
- Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται

*Exposure to ACE inhibitors prior to the onset of scleroderma renal crisis-Results from the International Scleroderma Renal Crisis Survey. Hudson M, Baron M, Tatibouet S, Furst DE, Khanna D; International Scleroderma Renal Crisis Study Investigators. **Semin Arthritis Rheum.** 2013 Oct 7. pii: S0049-0172(13)00204-7. doi: 10.1016/j.semarthrit.2013.09.008. [Epub ahead of print]*