



---

---

## Επανεμφάνιση Ca μαστού σε ασθενείς με ιστορικό Ca μαστού υπό αντι-TNF

---

---

Annals of the  
**RHEUMATIC DISEASES**  
The EULAR Journal

120 γυναίκες με PA υπό αντι-TNF-α και ιστορικό Ca μαστού πριν την έναρξη της βιολογικής θεραπείας (9,5 έτη μεταξύ διάγνωσης Ca και έναρξης αντι-TNF-α αγωγής) συγκρίθηκαν με ανάλογη ομάδα 120 PA ασθενών οι οποίοι δεν έλαβαν ποτέ αντι-TNF-α αγωγή

- Μετά από μια μέση παρακολούθηση 4,9 ετών, 9 ασθενείς στην ομάδα υπό anti-TNF-α και 9 ασθενείς στην ομάδα χωρίς anti-TNF-α αγωγή παρουσίασαν υποτροπή του Ca μαστού, ενδεικτικό ότι **ασθενείς με PA και ιστορικό Ca μαστού δεν παρουσιάζουν πιο συχνά υποτροπή της νεοπλασίας** αν λάβουν anti-TNF-α αγωγή ή κάποια άλλη συμβατική θεραπεία
- Τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευθούν σε ασθενείς με πολύ πρόσφατο ή φτωχής πρόγνωσης Ca μαστού

*TNF inhibitor therapy and risk of breast cancer recurrence in patients with rheumatoid arthritis: a nationwide cohort study. Raaschou P, Frisell T, Askling J; for the ARTIS Study Group;. Ann Rheum Dis. 2014 Aug 8. pii: annrheumdis-2014-205745. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-205745. [Epub ahead of print]*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη