



## ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ αντι-TNF-α ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### Ophthalmology

Επιτροπή του American Uveitis Society, μετά από συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, εξέδωσε συστάσεις για τη χρήση αντι-TNF-α παραγόντων σε φλεγμονώδεις οφθαλμολογικές καταστάσεις

- Τα Infliximab και adalimumab θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 1ης γραμμής ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών εκδηλώσεων της νόσου Behcet's
- Τα Infliximab και adalimumab θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 2ης γραμμής ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση ραγοειδίτιδας σχετιζόμενη με νεανική αρθρίτιδα
- Τα Infliximab και adalimumab θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν ως 2ης γραμμής ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση σοβαρών φλεγμονωδών οφθαλμολογικών καταστάσεων, μεταξύ των οποίων οπίσθια ραγοειδίτιδα, παν-ραγοειδίτιδα, σοβαρή ραγοειδίτιδα σχετιζόμενη με οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες και σκληρίτιδα, σε ασθενείς που απαιτείται να χορηγηθεί ανοσορύθμιση και σε ασθενείς στους οποίους έχει αποτύχει ή δεν είναι σε θέση να χορηγηθούν αντιμεταβολίτες ή αναστολείς καλσινευρίνης
- Στους ασθενείς αυτούς, προτιμώνται ως επιλογή τα Infliximab και adalimumab από το etanercept, το οποίο φαίνεται να σχετίζεται με μικρότερη πιθανότητα για θεραπευτική επιτυχία

*Expert Panel Recommendations for the Use of Anti-Tumor Necrosis Factor Biologic Agents in Patients with Ocular Inflammatory Disorders. Levy-Clarke G, Jabs DA, Read RW, Rosenbaum JT, Vitale A, Van Gelder RN. Ophthalmology. 2013 Dec 17. pii: S0161-6420(13)00893-2. doi: 10.1016/j.ophtha.2013.09.048. [Epub ahead of print]*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη