
Ρευματική πολυμυαλγία & καρδιαγγειακός κίνδυνος



3.249 ασθενείς με ρευματική πολυμυαλγία από το General Practice Research Database συγκρίθηκαν με ανάλογο πληθυσμό (12.735 άτομα). Κατά τη διάρκεια μέσης παρακολούθησης 7,8 ετών:

- ο κίνδυνος αγγειακών συμβαμάτων ήταν υψηλότερος (2,6 φορές) μεταξύ ασθενών με ρευματική πολυμυαλγία σε σχέση με ασθενείς χωρίς (36.1 v. 12.2 per 1000 person-years; adjusted hazard ratio **2.6**, 95% CI 2.4-2.9)
- ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος στην πρώιμη νόσο και σε ασθενείς ηλικίας < 60 ετών κατά τη διάγνωση

Risk of vascular events in patients with polymyalgia rheumatica. Hancock AT, Mallen CD, Muller S1, Belcher J, Roddy E, Helliwell T, Hider SL. CMAJ. 2014 Sep 16;186(13):E495-501. doi: 10.1503/cmaj.140266

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ :

<http://www.cmaj.ca/content/early/2014/07/28/cmaj.140266.full.pdf>

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη