

DVT στα ρευματικά νοσήματα (μετανάλυση)



Η μετανάλυση περιέλαβε 25 τελικά μελέτες με ασθενείς με φλεγμονώδη αρθρίτιδα ή CTD (SEL, SS, PM/DM, SSc) και έδειξε τουλάχιστον **3 φορές πιο συχνά φλεβική**

θρομβοεμβολική νόσο (VTE) σε σχέση με το γενικό πληθυσμό

- 10 μελέτες αφορούσαν ασθενείς με PA και 5.273.942 ασθενείς και 891.530.181 άτομα ως ομάδα ελέγχου, με συνολική επίπτωση VTE 2.18% (95% confidence interval (CI): 1.82% - 2.54%) και πιθανότητα (odds ratio) 2.23 (95% CI: 2.02 - 2.47)
- Σε 10 μελέτες με ασθενείς με ΣΕΛ και 54.697 ασθενείς, η συνολική επίπτωση VTE ήταν 7.29% (95% CI: 5.82% - 8.75%)
- Σε 4 μελέτες με Sjögren's syndrome και 25.100 ασθενείς, η συνολική επίπτωση VTE ήταν 2.18% (95% CI: 0.79% - 3.57%)
- Σε 4 μελέτες με φλεγμονώδη μυοσίτιδα και 8.245 ασθενείς, η συνολική επίπτωση VTE ήταν 4.03% (95% CI: 2.38% - 5.67%)
- Στο σκληρόδερμα και στις ANCA αγγειίτιδες, σε 4 μελέτες ανά νόσημα, η VTE ήταν αντίστοιχα ήταν 3.13% και 7.97%

A meta-analysis of the risk of venous thromboembolism in inflammatory rheumatic diseases. Jason J Lee. Janet E Pope Arthritis Res Ther. 2014; 16(5): 435. doi: 10.1186/s13075-014-0435-y

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη